

## Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

## Spesielle pasientgrupper

## Anbefalinger for de mest brukte antibiotika i primærhelsetjenesten til gravide og ammende

Legemiddelgruppe / virkestoff	1. trimester	2. trimester	3. trimester	Amming
<b>Penicilliner</b>				
Fenoksymetylpenicillin, kloksacillin, dikloksacillin, amoksisillin, pivampicillin, pivmecillinam	Førstehåndvalg			1
<b>Kefalosporiner</b>				
Cefaleksin	Kan brukes. Lite dokumentasjon for nyeste kefalosporiner.			1
<b>Linkosamider</b>				
Klindamycin	Andrehåndvalg			Lokalbehandling: 2 Systemisk bruk: 3
<b>Tetracycliner</b>				
Doksycyclin, tetracyclin	Andrehåndvalg	Kontraindisert etter uke 15		Syvdagers kur: 2 Langtidsbruk: 3
<b>Makrolider</b>				
Erytromycin	Andrehåndvalg. Kun på streng indikasjon	Andrehåndvalg	Andrehåndvalg. Kun på streng indikasjon etter uke 28.	1
Azitromycin				2
Klaritromycin				1
Spiramycin				Mangler data
Kloramfenikol	Lokalbehandling: Kan brukes	Lokalbehandling: Kan brukes	Lokalbehandling: Kan brukes	Lokalbehandling: 2
	Systemisk bruk: Alternativt antibiotikum bør benyttes.	Systemisk bruk: Alternativt antibiotikum bør benyttes.	Systemisk bruk: Kontraindisert.	
<b>Kinoloner</b>				
Ciprofloxacin, ofloxacin	Ingen holdepunkter for teratogene effekter hos mennesker. Andrehåndvalg.			3

Metronidazol	Ingen holdepunkter for teratogene effekter hos mennesker. Andrehåndsvalg.			Lokalbehandling: 2
				Systemisk bruk: 3
Trimetoprim-sulfametoksazol	Trim.: Alternativt antibiotikum bør benyttes.	Kan brukes	Sulfa.: Alternativt antibiotikum bør benyttes.	Trim.: 2. Unngå langtidsbruk.
				Sulfa.: 3. Forsiktighet hos barn med hyperbilirubinemi
Nitrofurantoin	Andrehåndsvalg			2

## Anbefalinger for de mest brukte antimykotika til gravide og ammende

Virkestoff	Graviditet (1., 2. og 3. trimester)	Amming
Ekonazol	Lokalbehandling: Kan brukes	1
Flukonazol	Lokalbehandling: Kan brukes	2
	Peroral behandling: Andrehåndsvalg	
Ketokonazol	Lokalbehandling: Kan brukes	2
Klotrimazol	Lokalbehandling: Kan brukes. Førstehåndsvalg	1 Førstehåndsvalg ved candidainfeksjon på brystene
Mikonazol	Lokalbehandling: Kan brukes	2
Terbinafin	Lokalbehandling: Andrehåndsvalg	2

### Tegnforklaring:

	Kan brukes. Ingen risiko i svangerskap eller ved amming. Andrehåndsvalg
	Kan ikke brukes. Økt risiko for skade av foster eller diebarn.

1. Kan brukes av ammende.
2. Kan brukes av ammende, men dokumentasjonen er svakere.
3. Usikkert om bruk hos ammende kan anbefales. Alle nye legemidler hvor overgang til morsmelk er ukjent og erfaring mangler, plasseres automatisk i denne kategorien.

Kategoriseringen 1 – 3 (for detaljert beskrivelse av kategoriene se Norsk Legemiddelhandbok, 2007)

Kilde: <http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showtopic&topic=NEadzNym&j=1>