

Rekvirent ID

Underskrift

(legekontor, adresse, dato)

- Allmenntidrett Annen spesialitet Poliklinikk Sykehjem Annet

Kopi av svarbrev ønskes sendt til

Kliniske opplysninger

Gravid, uke

Ref.nr. for pasientkobling

Fødselsdato

Personnr.

Kjønn
(K/M)

Kvinne Mann

Pasientnavn

Adresse

Postnr.

Poststed

Betales av

- HELFO:
 Bedriftshelsetjeneste:
 Institusjon:
 Annet:

Prøvetakingsdato

Tidspunkt (kl.)

Fylles ut av prøvetaker

Antimikrobiell behandling?

Nei Ja

Fra dato:

Til dato:

Medikament:

OBS! Kun 1 prøvemateriale pr. rekvisisjon.

Laboratoriet kan av og til velge å utføre tilleggsanalyser på grunnlag av kliniske opplysninger og den epidemiologiske situasjonen.

Abcess (eSwab)

Abcessinnhold - Aerobe og anaerobe bakterier

Lokalisasjon:.....

Arthritt (eSwab)

Leddvæske - Aerobe og anaerobe bakterier

Bakteriell vaginose, utflod (ikke SOS) (eSwab)

Cervixpensel - Bakterier og gjærsopp

Barnemark (tapepreparat)

Endetarmsåpning - Mikroskopi

Bursitt (eSwab)

Bursavæske - Aerobe og anaerobe bakterier

Gastroenteritt (FekalSwab - Cary Blair)

Aktuelt ved kontroll av smittefrihet etter positiv PCR, (angi funn på PCR) og bakterie som ikke dekkes av PCR

Feces - Dyrkning tidligere bakteriefunn

Bakterie:.....

Feces - Dyrkning av bakterie som ikke dekkes av PCR

Bakterie:.....

Halsinfeksjon/Tonsillitt (eSwab)

Sekret fra hals/tonsiller - Bakterier

Markinfeksjon, annet enn barnemark

(rør med formalin/fikseringsvæske)

Feces - Mikroskopi

Fylles ut av Furst

Munnhulesopp (eSwab)

Sekret fra lesjon - Gjærsopp

Otitis eksterna (eSwab)

Øregangsekret - Bakterie og gjær/muggsopp

Otitis media (eSwab)

Øregangsekret - Bakterier

Nasofarynxprøve - Bakterier

Pneumoni (eSwab)

Ekspektorat - Bakterier

Nasofarynxprøve - Bakterier

Screening MRSA (eSwab)

Se beskrivelse på baksiden

Sekret fra vestibulum nasi - MRSA

Halssekret - MRSA

Sekret fra perineum - MRSA

Sår - MRSA

Lokalisasjon:.....

Annet, spesifiser - MRSA

Lokalisasjon:.....

Screening ESBL (eSwab)

Rektalpensel - ESBL

Screening VRE (eSwab)

Rektalpensel - VRE

Annet:

Seksuelt overførbare sykdommer (SOS) (eSwab)

For resistensbestemmelse av gonokokker

Urethrapensel - Gonokokker

Cervixpensel - Gonokokker

Halssekret - Gonokokker

Rektalpensel - Gonokokker

Sinusitt (eSwab)

Sekret fra cavum nasi - Bakterier

Bihulesekret - Bakterier

Soppinfeksjon (Falconrør)

For PCR på dermatofytter se rekvisisjon for Molekylærbiologi - PCR

Hudavskrap - Dermatofytter

Negl - Dermatofytter

Hår - Dermatofytter

Sårinfeksjon (eSwab)

Sårsekret - Bakterier

Lokalisasjon:.....

Urinveisinfeksjon (rør med borsyre)

Midtstrømsurin - Bakterier

Permanent kateter - Bakterier

Engangskateterisering - Bakterier

Blærepunksjon - Bakterier

Poseprøve - Bakterier

Vulvitt (eSwab)

Pensel fra vulva - Bakterier og gjærsopp

Øyeinfeksjon (eSwab)

Konjunktivalsekret - Bakterier

For lab

- 222
 271
 GRAVI
 <16ÅR
 987
 INNL
 TILS
 HJ
 FU
 DR
 MAJ
 SFJ
 SS
 BERG
 VER

Sign

Velg riktig etikett. I tvilstilfelle velges etikett merket diverse.

Prøvetaking og forsendelse

www.furst.no/For/legekontoret/Prøvetaking og forsendelse
Hvis prøvene sendes med hentetjenesten kan prøver tas alle ukedager.
Hvis prøver sendes i posten - unngå å sende prøver i slutten av uken.

Mikrobiologisk prøvetaking

www.furst.no/For/legekontoret/Prøvetaking og forsendelse/Mikrobiologisk prøvetaking

Rør til dyrkning og molekylærbiologi

www.furst.no/For/legekontoret/Prøvetaking og forsendelse/Rør til dyrkning og molekylærbiologi

Holdbarhet for materiale for mikrobiologiske prøver

www.furst.no/For/legekontoret/Prøvetaking og forsendelse/Holdbarhet for mikrobiologiske prøver.

Underlivsinfeksjoner hos kvinner

www.furst.no/For/legekontoret/Prøvetaking og forsendelse/Underlivsinfeksjoner hos kvinner.

*Etikettene plasseres loddrett
utenpå fabrikantens etikett*



Resistensbestemmelse for gonokokker

Resistensbestemmelse av gonokokker krever at bakterien dyrkes. Det er viktig med kort forsendelsestid (maksimalt 1 dag) fordi bakterien tåler transport dårlig.

Ved screening/smitteoppsporing av personer uten kliniske symptomer på gonoré, anbefales urinprøve og/eller pensel (Aptima Swab) fra urethra, cervix eller rektum til PCR-undersøkelse. Se rekvisisjon for Molekylærbiologi - PCR.

Prøvetaking ved MRSA-screening

Bruk vanlig prøvetakingsutstyr og transportmedium (eSwab). Ta én prøve fra hvert prøvetakingssted. Riktig etikett må benyttes. Det er tilstrekkelig med én rekvisisjon pr. pasient/personale.

Hvis det planlegges en større screening, må dette avtales med laboratoriet. Kontakt da teamleder på mikrobiologisk avdeling, telefon: 22 90 95 17. Teamleder bør kontaktes ca 1 uke før screening er planlagt.

Prøvetaking av pasienter

Prøver tas fra følgende steder:

- ytterst i hvert nesebor (med samme pensel)
- svelg inklusiv tonsiller
- perineum
- sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden
- innstikksteder for fremmedlegemer
- hvis pasienten har permanent urinveiskateter tas det i tillegg urinprøve

Prøvetaking av personale

Ved forhåndsundersøkelse og smitteoppsporing tas prøver fra følgende steder:

- ytterst i hvert nesebor (med samme pensel)
- svelg inklusiv tonsiller
- sår, eksem, ferske arr, eller andre defekter i huden

Ved kontroll etter sanering tas prøvene på samme måte som hos pasienter.

Fürst Medisinsk Laboratorium

Tlf. 22 90 95 00 - post@furst.no - www.furst.no

Oslo sentrum, Dronningens gate 40, (kl. 07.30 - 15.00)

Furuset, Søren Bulls vei 25, (kl. 07.30 - 15.00, onsdager til kl. 20.00)

Majorstuen, Kirkeveien 64B, (kl. 07.30 - 15.00, tirsdager til kl. 20.00)

Sandefjord, Dronningens gt. 3, (kl. 07.30 - 15.00)

Bergen, Strandkaian 16

I sommerperioden og høytider kan enkelte prøvetakingsstasjoner ha endrede åpningstider eller være stengt.